

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく化学肥料の慣行レベル

(単位：kg/10a)

類別	作物名	作型	化学肥料の窒素分量	
水稲	水稲		10	
麦類	秋まき小麦	秋まき(きたほなみ以外)	15	
		きたほなみ	18	
	春まき小麦	普通まき	10	
		初冬まき	15	
豆類	大豆	露地	4	
	小豆	露地	5	
	菜豆	露地	7	
その他畑作物	ばれいしょ	露地	11	
	そば	露地	3	
	てんさい	露地	18	
	ひまわり	露地	8	
果菜類	トマト	ハウス	26	
		ハウス加温	31	
		ハウス長期どり・夏秋どり	29	
	ミニトマト	ハウス	28	
	きゅうり	ハウス	42	
	なす	露地	23	
	かぼちゃ	露地	13	
	えだまめ	露地	4	
	スイートコーン	露地	20	
		ハウス	22	
	さやいんげん	露地	8	
		ハウス	8	
	さやえんどう	露地	13	
	ししとう	ハウス	38	
	とうがらし(なんぼん)	ハウス	36	
	葉茎菜類	たまねぎ	露地	20
		ねぎ	露地	28
ハウス			25	
小ねぎ		露地	20	
		ハウス	20	
はくさい		露地	24	
		トンネル早春まき	35	
		ハウス	22	
キャベツ		ハウス早春まき	25	
		露地	26	
ハウス		ハウス	20	
		ほうれんそう	ハウス	14
ハウス越冬			16	
露地			15	
チコリ		露地	7	
モロヘイヤ		ハウス	14	
サンチュ		ハウス	27	
にんにく		露地	26	
みつば		軟化みつば(ハウス)	17	
しゅんぎく		抜き取り	14	
		摘み取り	26	
みずな		ハウス	17	
こまつな		露地	12	
		ハウス	16	
チンゲンサイ		露地	16	
		ハウス	15	
ターサイ		露地	18	
	ハウス	19		
あさつき	ハウス	35		
にら	ハウス	29		
食用ゆり	露地	25		

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく化学肥料の慣行レベル

(単位：kg/10a)

類別	作物名	作型	化学肥料の窒素分量
根菜類	だいこん	露地	8
		春まきトンネル	10
		ハウス	11
		ハウス早春まき	12
	にんじん	露地	16
	ごぼう	露地	21
	かぶ	露地	15
		ハウス	15
	はつかだいこん	ハウス	14
	ながいも	露地	23
ヤーコン	露地	11	
果実的野菜	すいか	露地	8
		ハウス	9
	メロン	露地	14
		ハウス	13
	まくわうり	露地	11
		ハウス	13
	いちご	露地	15
		ハウス	21
ハウス夏秋どり		21	
洋菜類	ピーマン	露地	31
		ハウス	37
	レタス	露地	16
		ハウス	14
	リーフレタス	露地	16
		ハウス	15
	サラダナ	露地	18
		ハウス	19
	セルリー	露地	54
		ハウス	54
	ブロッコリー	露地	27
	アスパラガス	ハウス	27
		立茎露地	50
立茎ハウス		50	
カリフラワー		露地	22
果樹	りんご	露地	7
	なし	日本種	15
		西洋種	12
	ぶどう	生食用	15
		醸造用	10
	おうとう	露地	14
	ブルーン	露地	14
	ハスカップ	露地	8
ブルーベリー	露地	10	

注1) 慣行レベルは、北海道内の各地域で慣行的に行われている化学肥料の施用量をいう。

注2) トマトの「長期どり・夏秋どり」は、収穫期間が4ヶ月以上で6月以降に収穫始めとなる作型をいう。